

Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 12 сарын 25 өдрийн

А/625 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН IX ЖАГСААЛТ

| | Эмийн нэр | Тун хэмжээ, хэлбэр | Багийн эмчийн салбар | Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв | Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг | Тусгай мэргэжлийн төв, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг | Нийтийн үйлчилгээ тэй эмийн сан | | |
|--|-----------|--------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 1.1 Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, хүчилтөрөгч | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Амьсгалаар хэрэглэх бэлдмэл | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| 1 | хүчилтөрөгч | амьсгалаар хэрэглэх (эмнэлгийн зориулалттай хий) | | | + | + | | |
| 2 | азотын дутуу исэл | амьсгалаар хэрэглэх | | | + | + | | |
| 3 | галотан | амьсгалаар хэрэглэх | | | + | + | | |
| 4 | изофлуран | амьсгалаар хэрэглэх | | | + | + | | |
| 5 | севофлуран | амьсгалаар хэрэглэх | | | | + | | |
| 1.1.2 Тарилгаар хэрэглэх бэлдмэл | | | | | | | | |
| 6 | кетамин | тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | | |
| 7 | тиопентал | тарилгын нунтаг, 0.5г - 1г (натрийн давс) | | | + | + | | |
| 8 | пропофол | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл | | | + | + | | |
| 1.2 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | | | | | | | | |
| 9 | прокайн | тарилгын уусмал, 0.25% - 1% (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж | |
| 10 | лидокайн | хэсэг газарт хэрэглэх, 2% - 4% (гидрохлорид) | | | + | + | + | |
| | | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл (гидрохлорид), 5% (нугасаар) | | | | + | + | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| | | мэдээгүйжүүлэх) | | | | | | | |
| | | тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин, 1:200000 (гидрохлорид) | | | + | + | | | |
| 11 | лидокайн + эпинефрин | шүдний зориулалттай тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин 1:80000, 1:100000 (гидрохлорид) | | | + | + | | | |
| 12 | эфедрин | тарилгын уусмал, 30мг/мл, 50мг/мл (гидрохлорид) төрөлтийн үед даралт унахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нугасаар мэдээгүйжүүлэх үед хэрэглэх | | | + | + | | | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | | | |
| 13 | бупивикайн | тарилгын уусмал, нугасны мэдээгүйжүүлэлтэд 5мг/мл + 7.5% глюкозтой хольж хэрэглэх | | | + | + | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|---|---|---|---|----|--|
| | | (гидрохлорид) | | | | | | | |
| 14 | ропивокайн | тарилгын уусмал, 7.5мг/мл | | | | | + | | |
| 1.3 Мэс засал, жижиг мэс ажилбарт хэрэглэх эм | | | | | | | | | |
| 15 | атропин | тарилгын уусмал, 0.5мг/мл - 1мг/мл (сульфат) | | + | + | + | | | |
| 16 | диазепам | тарилгын уусмал, 5мг/мл | | | + | + | | СЖ | |
| 17 | мидазолам | тарилгын уусмал, 1мг/мл | | | + | + | | | |
| 18 | морфин | тарилгын уусмал, 10 мг/мл (гидрохлорид, сульфат) | | | + | + | | МЖ | |
| 2. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 2.1 Опийн бус бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 19 | ибупрофен | шахмал, капсул, 600мг, | + | + | + | + | | Ж | |
| | | шахмал, капсул, 200мг-400мг | + | + | + | + | | ЖГ | |
| 20 | кетопрофен | гель, 2.5% | + | + | + | + | | ЖГ | |
| | | крем, 5% | + | + | + | + | | ЖГ | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---|---|---|---|----|---|--|
| | | шахмал, капсул, 50мг - 150мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | лаа, 50мг - 100 мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 50мг/мл | | | + | + | Ж | | |
| 21 | напроксен | шахмал, капсул, 275мг, 550мг | | | + | + | Ж | | |
| 22 | диклофенак | гель, 1% (натрийн давс) | + | + | + | + | ЖГ | | |
| | | крем, 1% (натрийн давс) | + | + | + | + | ЖГ | | |
| | | шахмал, капсул, нунтаг 25мг - 100мг (натрийн давс, калийн давс) | + | + | + | + | Ж | | |
| | | лаа, 100мг (натрийн давс) | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 25мг/мл - 75мг/мл (натрийн давс) | | | + | + | + | Ж | |
| 23 | ацеклофенак | крем, 1.5% | | | + | + | ЖГ | | |
| | | хөвмөлийн нунтаг, 100мг/3г | | | + | + | Ж | | |
| | | шахмал, 100мг | | | + | + | Ж | | |
| 24 | парацетамол | шахмал, 500 мг | + | + | + | + | ЖГ | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|----|--|--|
| | | лаа, 300мг - 500мг | + | + | + | + | ЖГ | | |
| 25 | налбуфин | тарилгын уусмал ,10мг/мл, 20мг/мл (гидрохлорид дигидрат) | | | + | + | Ж | | |
| 26 | лорноксикам | шахмал, 4мг - 8мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 8мг/мл | | | + | + | Ж | | |
| 27 | мелоксикам | шахмал, 7.5-15мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал , 10- 15мг/1мл, | | | + | + | Ж | | |
| | | гель, 1%-5гр | | | + | + | ЖГ | | |
| 2.2 Опийн бүлгийн бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 28 | кодейн | шахмал, 15мг - 30мг (фосфат) | | | + | + | МЖ | | |
| 29 | трамадол | шахмал, капсул, 50мг - 200 мг(гидрохлорид) | | + | + | + | СЖ | | |
| | | лаа, 50мг - 100мг (гидрохлорид) | | + | + | + | СЖ | | |
| | | тарилгын уусмал, 50мг/мл, (гидрохлорид) | | + | + | + | СЖ | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|---|---|----|---|--|
| 30 | морфин | шахмал, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат) | | | + | + | МЖ | | |
| | | лаа, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат) | | | + | + | МЖ | | |
| | | тарилгын уусмал, 1% - 1мл (гидрохлорид, сульфат) | | | + | + | МЖ | | |
| 31 | фентанил | тарилгын уусмал, 50мкг/мл (0.005%) | | | + | + | МЖ | | |
| 3. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 32 | преднизолон | шахмал, 5мг | | | + | + | + | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл | | | + | + | + | Ж | |
| 33 | метилпреднизолон | шахмал, 4мг - 16 мг (натрийн сукцинат) | | | + | + | + | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 6.31мг - 1000мг (натрийн сукцинат) | | | + | + | + | Ж | |
| 34 | дексаметазон | шахмал, 0.5мг - 4мг | | | + | + | + | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат) | | | + | + | + | Ж | |
| 35 | гидрокортизон | тарилгын нунтаг, 100мг - 125 мг | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|----|--|--|
| 36 | эпинефрин (адреналин) | тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидрoгений тартрат) | | + | + | + | | | |
| 37 | цетиризин | шахмал, 10мг (гидрохлорид, дигидрохлорид) | + | + | + | + | Ж | | |
| 38 | лоратадин | шахмал, 10мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 39 | дезлоратадин | шахмал, 5мг | | | + | + | ЖГ | | |
| 40 | левоцетиризин | шахмал, 5мг | | | + | + | Ж | | |
| 4. Антидотууд ба хордлого тайлах бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 4.1 Өвөрмөц бус | | | | | | | | | |
| 41 | идэвхжүүлсэн нүүрс | шахмал, 250мг | + | + | + | + | ЖГ | | |
| 42 | N-метилглюкамин сукцинат+натрийн хлорид+калийн хлорид+магнийн хлорид (реамберин) | дуслын шингэн, 1.5%-400мл (0.045гр+6гр+0.12гр+2.4гр) | | | + | + | | | |
| 4.2 Өвөрмөц | | | | | | | | | |
| 43 | кальцийн глюконат | шахмал, 500мг | + | + | + | + | ЖГ | | |
| | | тарилгын уусмал, 100мг/мл | | + | + | + | Ж | | |
| 44 | атропин | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат) | | + | + | + | | | |
| 45 | кальцийн левофолинат | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | | + | + | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|----|---|
| 46 | налоксон | тарилгын уусмал, 0.4мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | | |
| 47 | деферазирокс | шахмал, 180мг, 360мг, 500мг | | | + | + | Ж | |
| 5. Уналт, таталтын эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | |
| 48 | магнийн сульфат | тарилгын уусмал, 250 мг/мл | + | + | + | + | Ж | |
| 49 | вальпроны хүчил (натрийн вальпроат) | шахмал, капсул, 100мг - 500мг | | | + | + | Ж | |
| 50 | карбамазепин | шахмал, 200мг | | | + | + | Ж | |
| 51 | фенобарбитал | шахмал, 5мг - 100мг | | | + | + | СЖ | |
| 52 | дiazepam | шахмал, 10мг | | | + | + | СЖ | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл | | | + | + | СЖ | |
| 53 | ламотриджин | шахмал, капсул, 25мг - 100мг | | | | + | Ж | |
| 54 | габапентин | шахмал, капсул, 100мг - 600мг | | | | | + | Ж |
| 55 | топирамат | шахмал, капсул, 25мг - 100мг | | | | | + | Ж |
| 56 | леветирацетам | шахмал, капсул, 250мг - 1000мг | | | | | + | Ж |
| | | сироп, 100мг/мл | | | | | + | Ж |
| 57 | прегабалин | капсул, 75мг - 300мг | | | | | + | Ж |

| 6. Халдварын эсрэг бэлдмэл | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | |
| 58 | мебендазол | шахмал, капсул, 100мг, 500мг | | + | + | + | Ж |
| 59 | албендазол | шахмал, капсул, 200мг - 400мг | | + | + | + | Ж |
| 60 | пирантел | шахмал, капсул, 125мг - 250мг (эмбонат, памаот) | | + | + | + | Ж |
| 6.2 Бактерийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | |
| 6.2.1 Бета лактамын антибиотикууд | | | | | | | |
| 61 | бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1г (натрийн давс, калийн давс) | | + | + | + | Ж |
| 62 | бензатин бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1.2- 2.4 сая ОУН | | + | + | + | Ж |
| 63 | прокаин бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1г - 3г (=1 сая ОУН - 3 сая ОУН) | | + | + | + | Ж |
| 64 | ампициллин | шахмал, капсул 500мг | + | + | + | + | Ж |
| | | тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг (натрийн давс) | | + | + | + | Ж |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 65 | ампициллин + сульбактам | тарилгын нунтаг, 750мг - 3000мг, 1000мг-500мг, 500мг+250мг | | | + | + | Ж | | |
| 66 | амоксициллин | шахмал, капсул, 500мг , 1000мг (тригидрат) | + | + | + | + | Ж | | |
| 67 | амоксициллин +клавулоны хүчил | шахмал, 625мг - 1125мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 1200мг | | + | + | + | Ж | | |
| 68 | Амоксициллин+ сульбактам | шахмал, капсул, 1000мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 1500мг | | | + | + | Ж | | |
| 69 | имипенем + циластатин | тарилгын уусмал, 500мг + 500мг, 1000мг + 1000мг | | | + | + | Ж | | |
| 70 | меропенем | тарилгын нунтаг, 1г | | | + | + | | | |
| 71 | цефалексин | шахмал, капсул, 500мг (моногидрат) | + | + | + | + | Ж | | |
| 72 | цефадроксил | шахмал, капсул, 500мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 73 | цефазолин | тарилгын нунтаг, 1г (натрийн давс) | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---|----|--|--|
| 74 | цефотаксим | тарилгын нунтаг, 1000мг (натрийн давс) | | | + | + | Ж | | |
| 75 | цефтриаксон | тарилгын нунтаг, 750- 1000мг (натрийн давс) | | | + | + | Ж | | |
| 76 | цефтазидим | тарилгын нунтаг, 1000мг - 2000мг (пентагидрат) | | | + | + | Ж | | |
| 77 | цефепим | тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг | | | + | + | Ж | | |
| 6.2.2 Бусад антибиотууд | | | | | | | | | |
| 78 | сульфаметоксазол + триметоприм | шахмал, капсул, 400мг + 80мг , 800мг + 160мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 79 | мупирицин | тосон түрхлэг, 20мг/ 3- 15г | | | + | + | ЖГ | | |
| 80 | нитрофурантоин | шахмал, 50мг - 100мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 81 | метронидазол | шахмал, капсул, 400мг-500мг | | | + | + | Ж | | |
| | | үтрээний шахмал, 500мг - 1000мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын шингэн, 500мг/100мл | | | + | + | Ж | | |
| 82 | клиндамицин | шахмал, капсул, 150мг, 300мг (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | үтрээний капсул, 100мг (фосфат) | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 150мг/мл, 1% уусмал (фосфат) | | | + | + | Ж | | |
| 83 | кларитромицин | шахмал, капсул, 250мг - 500мг | | + | + | + | Ж | | |
| 84 | азитромицин | шахмал, капсул, 250мг - 500мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | сироп, 200мг/5мл | | + | + | + | Ж | | |
| 85 | гентамицин | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 40мг/мл (сульфат) | | + | + | + | Ж | | |
| 86 | доксциклин | шахмал, капсул, 100мг - 200мг (гидрохлорид, хиклат) | | + | + | + | Ж | | |
| 87 | офлоксацин | шахмал, капсул 100мг - 400мг | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын шингэн, 2мг/мл | | | + | + | Ж | | |
| 88 | норфлоксацин | шахмал, капсул, 400мг, | | | + | + | Ж | | |
| 89 | ципрофлоксацин | шахмал, капсул, 500мг - 750мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын шингэн, 1мг/мл - 2мг/мл тарилгын нунтаг 100мг/10мл | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 90 | спектиномицин | тарилгын нунтаг 2г (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 91 | имипенем + циластатин | тарилгын нунтаг 500 мг+500 мг | | | + | + | | | |
| 92 | ванкомицин | тарилгын нунтаг, 500 мг-1000 мг (гидрохлорид) | | | + | + | | | |
| 93 | пиперациллин + тазобактам | тарилгын нунтаг, 4г+500мг | | | + | + | | | |
| 94 | колистин | 2 сая ОУН-10мл | | | | + | | | |
| 95 | линезолид | тарилгын уусмал, 2мг/мл, | | | | + | | | |
| | | шахмал 600мг | | | | + | Ж | | |
| 6.2.3 Сүрьеэ эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 96 | изониазид | шахмал, капсул, 100 мг-300 мг | | | + | + | | | |
| 97 | этамбутол | шахмал, капсул, 100 мг-400мг (гидрохлорид) | | | + | + | | | |
| 98 | изониазид+этамбутол | шахмал, капсул, 150мг+400мг | | | + | + | | | |
| 99 | пиразинамид | шахмал, капсул, 400мг-500мг | | | + | + | | | |
| 100 | рифампицин | шахмал, капсул, 150мг-300мг | | + | + | + | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 101 | рифампицин+пиразинамид | шахмал, капсул, 150мг +75мг, 150мг+150мг | | | + | + | | | |
| 102 | рифампицин+изониазид+пиразинамид+эта мбутол | шахмал, капсул, 150мг + 75мг + 400мг + 275мг | | | + | + | | | |
| 103 | амикацин | тарилгын уусмал, 500мг (сульфат) | | | + | + | | | |
| 104 | канамицин | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат) | | | + | + | | | |
| 105 | стрептомицин | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат) | | | + | + | | | |
| 106 | левофлоксацин | шахмал, капсул, 500 мг | | | + | + | | | |
| | | тарилгын шингэн, 5мг/мл | | | + | + | | | |
| 107 | моксифлоксацин | шахмал, капсул 400мг | | | | | + | | |
| | | тарилгын шингэн, 400мг | | | | | + | | |
| 108 | клофазимин | шахмал, капсул, 100мг | | | | | + | | |
| 109 | линезолид | шахмал, капсул, 600мг | | | | | + | | |
| | | тарилгын шингэн, 200мг/мл | | | | | + | | |
| 6.3 Мөөгөнцрийн эсрэг эм | | | | | | | | | |
| 110 | нистатин | шахмал, 500000 ОУН | + | + | + | + | | Ж | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|--|---|---|---|----|--|--|
| 111 | клотримазол | крем, 1% | | + | + | + | ЖГ | | |
| | | үтрээний шахмал, 100мг - 500мг | | + | + | + | ЖГ | | |
| 112 | флуконазол | шахмал, капсул, 50мг - 200 мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын шингэн, 2мг/мл | | + | + | + | Ж | | |
| 113 | натамицин | крем, 2% | | | | + | Ж | | |
| | | лаа, 100мг | | | | + | ЖГ | | |
| | | шахмал, 100мг | | | | + | ЖГ | | |
| 114 | кетоконазол | шахмал, 200мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тосон түрхлэг, 20мг, 1% мазь | | + | + | + | ЖГ | | |
| 115 | итраконазол | капсул 100мг | | | + | + | Ж | | |
| 6.4 Эгэл биетний эсрэг эм | | | | | | | | | |
| 116 | метронидазол | шахмал, капсул, 400мг-500мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын шингэн, 500мг/100мл | | + | + | + | Ж | | |
| 6.5 Бруцеллэзын эсрэг эм | | | | | | | | | |
| 117 | доксциклин | шахмал, капсул, 100мг - 200мг (гидрохлорид, хиклат) | | + | + | + | Ж | | |
| 118 | рифампицин | шахмал, капсул 150мг- 300мг | | + | + | + | Ж | | |

| 6.6 Вирусийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|----|
| 6.6.1 Херпес вирусийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | |
| 119 | ацикловир | тосон түрхлэг, крем, 5% | + | + | + | + | ЖГ |
| | | шахмал, капсул, 400мг-800мг | | | + | + | Ж |
| 120 | валацикловир | шахмал, 500мг-1000мг | | | + | + | Ж |
| 6.6.2 Ретровирусийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | |
| 121 | ламивудин | шахмал, капсул, 100мг - 150мг | | | + | + | Ж |
| 122 | ставудин | шахмал, капсул, 15мг - 30мг | | | | + | Ж |
| 123 | невирапин | шахмал, 200мг | | | | + | Ж |
| 124 | эфавиренз | шахмал, 600мг | | | | + | Ж |
| 125 | тенофовир | шахмал, капсул, 300мг (дизопроксил фумарат), 25мг (алафенамид) | | | + | + | Ж |
| 126 | энтекавир | шахмал, капсул 0.5мг - 1мг | | | + | + | Ж |
| 127 | телбивудин | шахмал, капсул, 600мг | | | | + | Ж |
| 128 | софосбувир | шахмал, 400мг | | | | + | Ж |
| 129 | даклатасвир | шахмал, 30мг-60мг | | | | + | Ж |
| 6.6.3 Нийлмэл найрлагатай бэлдмэл | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|----|----|--|
| 130 | зидовудин + ламивудин | шахмал, капсул, 300мг + 150мг | | | | + | Ж | | |
| 131 | ламивудин + неврапин + ставудин | шахмал, 150мг + 200мг + 300мг | | | | + | Ж | | |
| 132 | ледипасвир + софосбувир | шахмал, 90мг + 400мг | | | | + | Ж | | |
| 133 | велпатасвир + софосбувир | шахмал, 100мг + 400мг | | | | + | Ж | | |
| 6.6.4 Вирусийн эсрэг бусад бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 134 | осельтамивир | шахмал, капсул, 30-75 мг | | | | + | + | Ж | |
| | | хөвмөл бэлтгэх нунтаг, 6мг/мл | | | | | | | |
| 135 | рибавирин | шахмал, капсул, 200мг | | | | + | + | Ж | |
| 136 | хүний цэвэршүүлсэн гамма интерфероны эсрэг бие | шахмал, 0.003г | + | + | + | + | ЖГ | | |
| 138 | пегинтерферон альфа (2А, 2В) | тарилгын уусмал, 80мкг - 180 мкг | | | | | + | Ж | |
| 139 | инозин паранобекс | шахмал 500мг | | | | | | Ж | |
| 140 | интерфероны индуктор | шахмал, 12мг | | | | | + | ЖГ | |
| 7. Мигрень эмчлэх бэлдмэл | | | | | | | | | |

| 7.1 Цочмог өвдөлт намдаах эм | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|---|---|---|---|----|
| 141 | парацетамол | шахмал 500мг | + | + | + | + | ЖГ |
| | | лаа, 300мг - 500 мг | + | + | + | + | ЖГ |
| 142 | ибупрофен | шахмал, капсул 600мг | | | | | Ж |
| | | шахмал, капсул 200-400мг | + | + | + | + | ЖГ |
| 7.2 Урьдчилан сэргийлэх | | | | | | | |
| 143 | пропранолол | шахмал 10мг-40мг | | + | + | + | Ж |
| 8. Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний бэлдмэл | | | | | | | |
| 8.1 Дархлал дарангуйлах эм | | | | | | | |
| 144 | азатиопирин | шахмал, капсул, 50мг | | | + | + | Ж |
| 145 | базиликсимаб | тарилгын нунтаг, 20мг | | | + | + | |
| 146 | циклоспорин | шахмал, капсул, 50мг - 100мг | | | + | + | Ж |
| | | тарилгын уусмал, 50мг/мл | | | + | + | |
| 147 | такролимус | шахмал, капсул, 0.5мг - 5мг | | | | + | Ж |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл | | | | + | |
| 148 | эверолимус | шахмал, 0.25мг - 10мг | | | | + | Ж |

8.2 Хорт хавдрын эсрэг эм

| 8.2 Хорт хавдрын эсрэг эм | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---|--|--|---|---|----|
| 149 | винкристин | тарилгын нунтаг, 1мг - 5мг (сульфат) | | | + | + | Ж* |
| 150 | кальцийн фолинат | шахмал капсул, 5мг - 25мг | | | + | + | Ж* |
| | | тарилгын уусмал, 3мг/мл | | | + | + | Ж* |
| 151 | метотрексат | шахмал, 2.5мг (натрийн давс) | | | + | + | Ж* |
| | | тарилгын уусмал, 25мг/мл (натрийн давс) | | | + | + | Ж* |
| 152 | флюороурацил | тарилгын уусмал, 20мг/мл - 50мг/мл | | | + | + | Ж* |
| 153 | месна | тарилгын уусмал, 100мг/мл | | | | + | Ж* |
| 154 | ифосфамид | тарилгын нунтаг, 1г - 2г | | | | + | Ж* |
| 155 | циклофосфамид | шахмал, 25мг - 100мг | | | + | + | Ж* |
| | | тарилгын нунтаг, 100мг - 500мг | | | + | + | Ж* |
| 156 | цитарабин | тарилга (уусмал) 100мг - 500мг, (нунтаг) 100мг - 1000мг | | | | + | Ж* |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|--|--|---|---|----|--|--|
| 157 | доксорубин | тарилга (уусмал, нунтаг) 10мг-50мг | | | + | + | Ж* | | |
| 158 | дакарбазин | тарилгын нунтаг, 100мг-200мг | | | + | + | Ж* | | |
| 159 | дактиномицин | тарилгын нунтаг, 0.5мг | | | + | + | Ж* | | |
| 160 | паклитаксел | тарилгын уусмал, 6мг/мл | | | + | + | Ж* | | |
| 161 | цисплатин | тарилгын уусмал, 1мг/мл | | | + | + | Ж* | | |
| 162 | карбоплатин | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | | + | + | Ж* | | |
| 163 | оксалиплатин | тарилгын уусмал, 5мг/мл | | | + | + | Ж* | | |
| 164 | капецитабин | шахмал, капсул, 150мг - 500мг | | | | + | Ж* | | |
| 165 | гемцитабин | тарилгын нунтаг, 100мг - 1000мг | | | + | + | Ж* | | |
| 166 | доцетаксел | тарилгын уусмал, 20мг/мл - 40мг/мл | | | + | + | Ж* | | |
| 167 | иринотекан | тарилгын уусмал, 20мг/мл | | | | + | | | |
| 168 | микофенолын хүчил | шахмал, капсул, 180мг - 360мг | | | | + | Ж* | | |
| 169 | золедроны хүчил | тарилгын уусмал, 4мг/5мл | | | | + | Ж* | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|---|---|---|----|---|--|
| 170 | флударабин | тарилгын уусмал, нунтаг, 50мг | | | | + | Ж* | | |
| 8.2.1 Хорт хавдарын эсрэг бай эмчилгээ | | | | | | | | | |
| 171 | трастузумаб | тарилгын нунтаг, 150мг-440мг | | | | + | | | |
| 172 | руксолитиниб | шахмал, 5мг-20 мг | | | | + | Ж* | | |
| 173 | рибоциклиб | шахмал, 200 мг | | | | + | Ж* | | |
| 174 | лапатиниб | шахмал, 250мг | | | | + | Ж* | | |
| 175 | траметиниб | шахмал, 0.5мг-2 мг | | | | + | Ж* | | |
| 176 | пазопаниб | шахмал, 400мг | | | | + | Ж* | | |
| 177 | бевацизумаб | тарилгын уусмал , 25мг/мл | | | | + | Ж* | | |
| 178 | йофоластат | капсул, 50-75 мг | | | | + | Ж* | | |
| 179 | нилотиниб | шахмал , 150-200мг | | | | + | Ж* | | |
| 8.3. Хорт хавдрын эсрэг даавар түүний эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 180 | анастрозол | шахмал, 1 мг | | | | + | + | Ж | |
| 181 | преднизолон | шахмал, 5мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл | | + | + | + | Ж | | |
| 182 | метилпреднизолон | шахмал, 8мг - 16 мг (натрийн сукцинат) | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|---|---|---|----|--|--|
| | | тарилгын уусмал, 500мг - 1000мг (натрийн сукцинат) | | + | + | + | Ж | | |
| 183 | дексаметазон | тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат) | | + | + | + | Ж | | |
| 184 | тамоксифен | шахмал, капсул 10мг - 20мг (цитрат) | | | + | + | Ж | | |
| 185 | летрозол | шахмал, 2.5мг | | | | + | Ж | | |
| 8.4 Зовиур хөнгөвчлөх эмчилгээний эм | | | | | | | | | |
| 186 | кодеин | шахмал, 15мг - 30мг (фосфат) | | | + | + | МЖ | | |
| 187 | морфин | шахмал, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат) | | | + | + | МЖ | | |
| | | тарилгын уусмал, 1% - 1мл (гидрохлорид, сульфат) | | | + | + | МЖ | | |
| 188 | фентанил | тарилгын уусмал, 50мкг/мл (0.005%) | | | + | + | МЖ | | |
| 189 | петидин | тарилгын уусмал, 5% - 2мл | | | + | + | МЖ | | |
| 9. Паркинсон өвчний эмчилгээний бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 190 | леводопа+ карбидопа | шахмал, 100мг + 10мг; 100мг + 25мг, 250мг + 25мг | | | + | + | Ж | | |

10. Цусны тогтолцоонд нөлөөлөх бэлдмэл

10.1 Цус төлжүүлэх эм

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--|---|---|---|---|----|--|--|
| 191 | фолийн хүчил | шахмал, 1мг | + | + | + | + | ЖГ | | |
| | | шахмал, 5 мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 192 | цианокобаламин | тарилгын уусмал, 500мкг - 3000мкг | | + | + | + | Ж | | |
| 193 | эритропоэтин | тарилгын уусмал, 1000 ОУН - 40000 ОУН | | | + | + | Ж | | |
| 194 | элтромбопаг | 25- 50 мг шахмал | | | + | + | | | |
| 195 | лейковорин | 50мг/5мл, 15мг/2мл тарилга | | | | + | Ж | | |

10.2 Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 196 | аминокапроны хүчил | Тарилгын уусмал, 5%, 40% | | + | + | + | Ж | | |
| 197 | гепарин | тарилгын уусмал, 1000 ОУН/мл - 20000 ОУН/мл (натрийн давс) | | + | + | + | Ж | | |
| 198 | этамсилат | шахмал, капсул, 250мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 250мг | | | + | + | Ж | | |
| 199 | варфарин | шахмал, 1мг - 5мг (натрийн давс) | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
| 200 | протамин | тарилгын уусмал, 10мг/мл (сульфат) | | | + | + | Ж | | |
| 201 | клопидогрел | шахмал, 75мг | | | | + | Ж | | |
| 202 | транексамын хүчил | шахмал, 250мг - 500мг | | | | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 50мг/мл, 100мг/мл, 5мл | | | | + | | | |
| 203 | эноксапарины натри | тарилгын уусмал, 4000 ОУН, 6000 ОУН | | | | + | Ж | | |
| 204 | ривароксабан | шахмал, 10мг - 20мг | | | | + | Ж | | |
| 11.Цусны бэлдмэл, сийвэн орлох бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 11.1 Сийвэн сэлбэх эм | | | | | | | | | |
| 205 | амин хүчлийн нийлмэл бэлдмэл | тарилгын шингэн, 250мл - 2500мл | | | + | + | | | |
| 206 | тосны хүчлийн нийлмэл бэлдмэл | тарилгын шингэн, 250мл - 2500мл | | | + | + | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| 207 | амин хүчлийн нийлмэл бэлдмэл + тосны хүчлийн нийлмэл бэлдмэл + эрдэс бодис | тарилгын шингэн, 250мл - 2500мл | | | + | + | | |
| 11.2 Сийвэнгийн бэлдмэл | | | | | | | | |
| 208 | желофондин | тарилгын уусмал, 100мл - 500мл | | | | + | | |
| 209 | хүний (хэвийн) иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 50мг/мл (5% - 16%) | | | + | + | Ж | |
| 210 | альбумин | тарилгын шингэн, 5% - 20% | | | + | + | Ж | |
| 11.3 Цус ба цусан бүтээгдэхүүн | | | | | | | | |
| 211 | шинэ хөлдөөсөн сийвэн | | | | + | + | | |
| 212 | тромбоцитүүд | | | | + | + | | |
| 213 | цусны улаан эсүүд | | | | + | + | | |
| 214 | донорын цус | | | | + | + | | |
| 12. Зүрх, судасны тогтолцоонд нөлөөлөх бэлдмэл | | | | | | | | |
| 12.1 Зүрхний бах эмчлэх бэлдмэл | | | | | | | | |
| 216 | глицерил тринитрат | шахмал, 500мг | + | + | + | + | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 1мг/мл-10мл | | | + | + | Ж | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | цацлага, 0.4мг | | | + | + | Ж | | |
| 217 | изосорбид мононитрат | шахмал, 5мг - 50мг | | + | + | + | Ж | | |
| 218 | изосорбид динитрат | шахмал, 5мг - 50мг | | + | + | + | Ж | | |
| 219 | верапамил | шахмал, 40мг - 80мг (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 2.5мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 220 | бисопролол | шахмал, 1.25мг - 10мг | | | + | + | Ж | | |
| 221 | никардипин | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | | + | + | Ж | | |
| 222 | окспренолол | шахмал, 40мг - 80мг | | | | + | Ж | | |
| 223 | триметазидин | шахмал, 20мг, 35мг | | | | + | Ж | | |
| 224 | метопролол | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл | | | + | + | Ж | | |
| | | шахмал, 50-100мг | | + | + | + | Ж | | |
| 12.2 Зүрхний хэм алдалтын эсрэг эм | | | | | | | | | |
| 225 | пропранолол | шахмал, 20мг - 40мг | | + | + | + | Ж | | |
| 226 | амиодарон | шахмал, 100мг - 200мг (гидрохлорид) | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 50мг (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|
| 227 | верапамил | шахмал, 40мг - 80мг (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 2.5мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 228 | лидокаин | тарилгын уусмал, 20мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 229 | эпинефрин (адреналин) | тарилгын уусмал, 1мг/1мл (гидрохлорид, гидрогений тартрат) | | + | + | + | | | |
| 230 | прокаинамид | шахмал, 250мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 100мг | | | + | + | | | |
| 231 | метопролол | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл | | | + | + | Ж | | |
| | | шахмал, 50-100мг | | + | + | + | Ж | | |
| 12.3 Цусны даралт бууруулах эм | | | | | | | | | |
| 232 | гидрохлортиазид | шахмал, 25мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 233 | метилдопа | шахмал, 250мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 234 | атенолол | шахмал, 50мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 235 | метопролол | шахмал, 50-100мг | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл | | | + | + | Ж | | |
| 236 | карведилол | шахмал, 6.25мг - 25мг | | | + | + | Ж | | |
| 237 | лабеталол | шахмал, 100мг - 400мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл-20мг | | | + | + | | | |
| 238 | амлодипин | шахмал, 5мг - 10мг (малеат, месилат, бесилат) | | + | + | + | Ж | | |
| 239 | эналаприл | шахмал, 2.5мг - 20мг (малеат) | + | + | + | + | Ж | | |
| 240 | рампиприл | шахмал, 1.25мг - 10мг | | + | + | + | Ж | | |
| 241 | лизиноприл | шахмал, 2.5мг - 20мг | | | + | + | Ж | | |
| 242 | периндоприл | шахмал, 4мг - 8мг | | | + | + | Ж | | |
| 243 | лозартан | шахмал, 12.5мг - 100мг | | | + | + | Ж | | |
| 244 | валсартан | шахмал, 25мг - 160мг | | | + | + | Ж | | |
| 245 | ирбесартан | шахмал, 150мг - 300мг | | | + | + | Ж | | |
| 246 | телмисартан | шахмал, 40 мг, 80мг | | | + | + | Ж | | |
| 247 | натрийн нитропруссид | тарилгын нунтаг, 50мг | | | + | + | | | |
| 248 | урапидил | шахмал, капсул 30мг - 90мг | | | | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл | | | | + | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|
| 249 | никардипин | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | | + | + | | | |
| 250 | пириндоприл+амлодипин | шахмал, 4мг+10мг,8мг+5мг,8мг +10 мг, 4мг+5мг | | | + | + | Ж | | |
| 251 | эналаприл +гидрохлортиазид | шахмал, 10мг+12.5мг, 10мг+25мг, 20мг+12.5 мг | | | + | + | Ж | | |
| 252 | рампиприл+ гидрохлортиазид | шахмал, 2.5мг+12.5мг, 5 мг+25мг | | | + | + | Ж | | |
| 253 | индапамид+периндоприл | шахмал, 4мг+1,25мг, 8 мг+2.5мг | | | + | + | Ж | | |
| 254 | лозартан+гидрохлорид | шахмал, 50 мг+12.5мг, 100 мг+25 мг | | | + | + | Ж | | |
| 255 | валсартан+гидрохлортиазид | шахмал, 80мг+12.5мг, 160 мг+12.5мг | | | + | + | Ж | | |
| 256 | амлодипин+лизиноприл | шахмал, 5 мг+10мг,10 мг+20 мг | | | + | + | Ж | | |
| 257 | лизиноприл + гидрохлоротиазид | шахмал,10мг + 12.5мг, 20м г + 12.5мг | | + | + | + | Ж | | |
| 258 | амлодипин + лозартан | шахмал, капсул 5мг+50мг, 5мг+100мг,10мг+50мг, 10мг+100мг, | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 259 | амлодипин + валсартан | шахмал, 5мг + 80мг, 5мг + 160мг, 10мг + 160мг | | + | + | + | Ж | | |
| 260 | амлодипин + валсартан + гидрохлоротиазид | шахмал, 5мг + 160мг + 12.5мг, 10мг + 160мг + 12.5мг | | + | + | + | Ж | | |
| 261 | сакубитрил + валсартан | 24мг+26мг, 49мг+51мг, 97мг+103мг шахмал | | | + | + | Ж | | |
| 262 | периндоприл+ амлодипин+ индапамид | 4мг+5мг+1,25мг, 4мг+10мг+1,25мг, 8мг+5мг+2,5мг, 8мг+10мг+2,5мг шахмал | | | + | + | Ж | | |
| 263 | метопролол | 50-100мг шахмал; | | + | + | + | Ж | | |
| | | 1мг/мл-5мл тарилга | | | + | + | Ж | | |
| 12.4 Зүрх судасны дутмагшилд хэрэглэх эм | | | | | | | | | |
| 264 | дигоксин | шахмал, 0.25мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 0.025% (10мг/мл) | | | + | + | | | |
| 265 | рамприл | шахмал, 1.25мг - 10мг | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|----|--|
| 266 | допамин | тарилгын уусмал, 40мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | | |
| 267 | добутамин | тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | | |
| 268 | сакубитрил+валсартан | 24мг+26мг, 49мг+51мг, 97мг+103мг шахмал | | | + | + | Ж | |
| 269 | аденозинтрифосфат (АТФ) | шахмал, 21.96 мг | | + | + | + | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 21,96 мг | | | + | + | | |
| 270 | ивабрадин | шахмал, 5мг, 7.5мг | | | | + | Ж | |
| 271 | метопролол | шахмал, 50 мг-100 мг | | + | + | + | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 1мг/мл-5мл | | | + | + | Ж | |
| 12.5 Тромбоцитын агрегацийн эсрэг хэрэглэх эм | | | | | | | | |
| 272 | ацетилсалицилын хүчил | шахмал, 81мг - 100мг | + | + | + | + | ЖГ | |
| 273 | алтеплаза | тарилгын нунтаг, 10мг - 50мг | | | | + | | |
| 274 | клопидогрел+аспирин | шахмал,капсул 75 мг+100 мг | | | | + | Ж | |
| 12.6 Липид бууруулах бэлдмэл | | | | | | | | |
| 275 | аторвастатин | шахмал, 10мг - 40мг | | | + | + | Ж | |
| 276 | розувастатин | шахмал, 5мг - 20мг | | | + | + | Ж | |

| 13. Арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---|---|---|----|
| 13.1 Мөөгөнцрийн эсрэг эм (хэсэг газрын) | | | | | | | |
| 277 | бензоины хүчил + салицилын хүчил | тосон түрхлэг, крем, 6% + 3% | + | + | + | + | ЖГ |
| 278 | клотримазол | тосон түрхлэг, крем, 1% | | + | + | + | ЖГ |
| 279 | натрийн тиосульфат | уусмал, 15% | | + | + | + | ЖГ |
| 280 | селений сульфид | хөвмөл, 2% | | | + | + | ЖГ |
| 281 | тербинафин | гель, крем, цацлага (спрэй) 1% (гидрохлорид) | | | + | + | Ж |
| | | шахмал, 250мг | | | + | + | Ж |
| 13.2 Халдварын эсрэг эм | | | | | | | |
| 282 | калийн перманганат | гадуур хэрэглэх уусмал, 1:10000 | + | + | + | + | ЖГ |
| 283 | метилтионинийн хлорид (метилен хөх) | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% | + | + | + | + | ЖГ |
| 284 | тетрациклин | тосон түрхлэг, 3% | | + | + | + | Ж |
| 285 | мупиноцин | тосон түрхлэг, крем 2% | | | + | + | ЖГ |
| 286 | мөнгөний сульфадиазин | тосон түрхлэг, крем 10мг/г | | | + | + | ЖГ |
| 13.3 Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|---|---|---|---|----|--|
| 287 | флуоцинолоны ацетонид | тосон түрхлэг, 0.025% | + | + | + | + | Ж | | |
| 288 | гидрокортизон (Х) | тосон түрхлэг, крем, 0.1% - 1% (бутират, ацетат) | | | + | + | + | Ж | |
| 289 | бетаметазон | тосон түрхлэг, 0.05% - 0.1% (дипропионат) | | | | + | + | ЖГ | |
| 290 | хлоргексидин | 0.5г+0.2г-125мл, 0.5г+0.2г-300мл уусмал | | | | + | + | ЖГ | |
| 291 | секукинумаб | 150 мг тарилгын нунтаг | | | | | + | Ж | |
| 13.4 Арьсны эвэрлэгт нөлөөлөх ба гуужуулах эм | | | | | | | | | |
| 292 | бензоил пероксид | гадуур хэрэглэх уусмал, Крем, 5% | | | | + | + | ЖГ | |
| 293 | салицилын хүчил | гадуур хэрэглэх уусмал, 5% | | | | + | + | ЖГ | |
| 294 | подофиллотоксин | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 25% | | | | + | + | Ж | |
| 295 | кальципотриол | тосон түрхлэг, 50мкг/г | | | | | + | ЖГ | |
| 13.5 Хамуу эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 296 | бензилбензоат | шингэн тосон түрхлэг, 10% - 20% | | | + | + | + | ЖГ | |
| 297 | перметрин | крем, 5% | | | | | + | ЖГ | |
| | | гадуур хэрэглэх уусмал, 1% | | | | | + | ЖГ | |

| 13.6 Хэт ягаан туяанаас хамгаалах бэлдмэл | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|----|--|--|
| 298 | цайрын исэл | тосон түрхлэг, 10% | + | + | + | + | ЖГ | | |
| 14. Оношлогооны бодисууд | | | | | | | | | |
| 14.1 Нүдний бэлдмэлүүд | | | | | | | | | |
| 299 | тропикамид | нүдний дусал, 0.5% - 1% | | | + | + | | | |
| 300 | трипан хөх нүдний уусмал (trypan blue ophthalmic solution) | уусмал, 0.6мг/мл | | | + | + | | | |
| 301 | флюоросцен | нүдний дусал, 0.5% - 1% (натрийн давс) | | | + | + | | | |
| 302 | митомицин | нунтаг, 2мг | | | + | + | | | |
| 14.2 Рентген тодруулагч бодис | | | | | | | | | |
| 303 | амидотризоат | тарилгын уусмал, 140мг иод/мл - 420 иод/мл (натрийн давс, меглуминий давс) | | | + | + | | | |
| 304 | барийн сульфат | нунтаг, усан цийдмэг | | | + | + | | | |
| 305 | иогексол | тарилгын уусмал, 140мг иод/мл - 350мг иод/мл | | | | + | | | |
| 306 | иодиксанол | тарилгын уусмал, 270мг иод/мл - 320мг иод/мл | | | | + | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|----|--|
| 307 | иопромид | тарилгын уусмал, 240мг иод/мл - 370мг иод/мл | | | | | + | | | |
| 308 | липиодол/этиодол | тарилгын уусмал, 480мг иод/мл | | | | | + | | | |
| 15. Халдваргүйжүүлэх ба үжлийн эсрэг бодис | | | | | | | | | | |
| 15.1 Үжлийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | | | |
| 309 | повидон иод | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 10% | + | + | + | | + | | ЖГ | |
| 310 | хлоргексидин | гадуур хэрэглэх уусмал, 5% (диглюконат) (шингэлэх) | | | + | + | + | | ЖГ | |
| 311 | этанол | гадуур хэрэглэх уусмал, 70% (денатурат) | | | + | + | + | | ЖГ | |
| 15.2 Халдваргүйжүүлэх бодис | | | | | | | | | | |
| 312 | устөрөгчийн хэт исэл | гадуур хэрэглэх уусмал, 3% | + | + | + | | + | | ЖГ | |
| 313 | хлорт нэгдлүүд | нунтаг, 0.1% - 3% (идэвхтэй хлор бүхий) | + | + | + | | + | | ЖГ | |
| 314 | дөрөвдөгч аммонны нэгдлүүд | гадуур хэрэглэх уусмал, 2% - 9% | | | | + | + | | ЖГ | |
| 315 | глутаральдегид | гадуур хэрэглэх уусмал, 2% | | | | + | + | | ЖГ | |

| 16. Бөөр, шээсний замд нөлөөлөх бэлдмэл | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|----|--|--|
| 16.1 Шээлгэх эм | | | | | | | | | |
| 316 | гидрохлортиазид | шахмал, 25мг - 100мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 317 | фуросемид | шахмал, 10мг - 40мг | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | + | + | + | Ж | | |
| 318 | торасемид | шахмал, 2.5мг - 10мг | | + | + | + | Ж | | |
| 319 | спиринолактон | шахмал, 25мг - 100мг | | + | + | + | Ж | | |
| 320 | индапамид | шахмал, 1.5мг - 2.5мг | | + | + | + | Ж | | |
| 321 | маннитол | тарилгын шингэн, 10% - 20% | | + | + | + | Ж | | |
| 322 | ацетазоламид | шахмал, 250мг | | | + | + | Ж | | |
| 16.2 Бусад | | | | | | | | | |
| 323 | кетто амин хүчил (бөөрний дутагдалд) | шахмал, 630мг | | | + | + | Ж | | |
| 324 | Фосфомицин | 2 г тарилгын нунтаг, 3 г мөхлөг | | | + | + | Ж | | |
| 17. Ходоод гэдэсний замын эмгэгүүдэд хэрэглэх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 17.1 Ходоодны хүчлийг багасгах ба өвчнийг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 325 | хөнгөнцагааны гидроксид/фосфат + магнийн гидроксид/карбонат | шахмал (нийлмэл найрлагатай) | | + | + | + | ЖГ | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|--|---|---|---|----|--|--|
| | | сироп, (нийлмэл найрлагатай) | | + | + | + | ЖГ | | |
| 326 | ранитидин | шахмал, 150мг - 300мг (гидрохлорид) | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 327 | фамотидин | шахмал, капсул, 20мг - 40мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 20мг | | + | + | + | Ж | | |
| 328 | омепразол | шахмал, капсул, 20мг - 40мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 40мг | | | + | + | Ж | | |
| 329 | эзомепразол | шахмал, капсул, 20мг- 40 мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 40 мг | | | + | + | Ж | | |
| 330 | лансопразол | шахмал, капсул, 30мг | | | + | + | Ж | | |
| 331 | пантопразол | шахмал, капсул, 20мг - 40мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 40мг | | | | + | Ж | | |
| 332 | висмутын субцитрат | шахмал, капсул, 120мг | | | + | + | ЖГ | | |
| 333 | сукралфат | шахмал, капсул, 0.5г - 1г | | | + | + | Ж | | |
| 334 | мизопростол | шахмал, 200мкг | | | + | + | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|---|---|---|---|----|--|--|
| 335 | итоприд гидрохлорид | шахмал, 50мг | | | + | + | Ж | | |
| 17.2 Бөөлжилт намдаах эм | | | | | | | | | |
| 336 | метоклопрамид | шахмал, 10мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид) | | + | + | + | Ж | | |
| 337 | домперидон | шахмал, 10мг | | | + | + | ЖГ | | |
| 338 | ондансетрон | шахмал, 4мг - 24мг (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 17.3 Үрэвслийн эсрэг эм | | | | | | | | | |
| 339 | сульфасалазин | шахмал, капсул, 500мг | | + | + | + | Ж | | |
| 340 | месалазин | лаа, 500-1000 мг | | | | + | Ж | | |
| | | шахмал, 500 мг | | | | + | Ж | | |
| 341 | гидрокортизон | тарилгын нунтаг, 100мг - 125 мг (натрийн сукцинат) | | | + | + | | | |
| 17.4 Агчил тавиулах эм | | | | | | | | | |
| 342 | дротаверин | шахмал, 40мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | ЖГ | | |
| | | тарилгын уусмал, 20мг/мл (гидрохлорид) | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|----|--|
| 343 | атропин | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат) | | | + | + | | |
| 344 | гиосцин | шахмал, 10мг (бутилбромид, гидробромид) | | | + | + | ЖГ | |
| | | тарилгын уусмал, 20мг/мл, 400мкг/мл, 600мкг/мл (бутилбромид, гидробромид) | | | | + | Ж | |
| 17.5 Туулгах эм | | | | | | | | |
| 345 | бисакодил | шахмал, 5мг | + | + | + | + | Ж | |
| | | лаа, 10мг | | + | + | + | ЖГ | |
| 346 | лактолоза | сироп, 667мг/мл | | + | + | + | ЖГ | |
| 17.6 Суулгалт намдаах эм | | | | | | | | |
| 347 | олон найрлагат давсны бэлдмэл | нунтаг, (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/ натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л | + | + | + | + | ЖГ | |
| 348 | лоперамид | шахмал, капсул, 2мг | | + | + | + | Ж | |
| 17.7 Элэг цэсний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх болон элэг хамгаалах бэлдмэл | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|---|---|---|----|--|--|
| 349 | силимарин | шахмал, капсул, 3.5мг - 140мг | + | + | + | + | ЖГ | | |
| 350 | урсодеоксихолийн хүчил | шахмал, капсул, 100мг - 400мг | | + | + | + | ЖГ | | |
| 351 | фосфолипид | шахмал, капсул, 300мг | | + | + | + | ЖГ | | |
| | | тарилгын уусмал, 250мг | | + | + | + | Ж | | |
| 352 | л-орнитин - л - аспарат | шахмал, капсул, 150мг - 500мг | | | + | + | Ж | | |
| | | мөхлөг, 3г | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 5г | | | + | + | Ж | | |
| 353 | адеметионин | шахмал, 400мг | | | | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 400мг | | | | + | Ж | | |
| 354 | амин хүчил (элэгний дутмагшилд) | мөхлөг, 3г+4.15 г | | | | + | Ж | | |
| 355 | гимекромон | шахмал, 200мг | | | | + | Ж | | |
| 356 | моноаммони глициризинат + глицин+DL- метионин (глицерон) | шахмал, 25мг+25мг+35мг | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|----|--|--|
| 357 | моноаммоны глициризинат+глицин+Л-цистеин гидрохлоридын гидрат | тарилга, 53мг+400мг+22.29мг | | | + | + | Ж | | |
| 17.8 Ходоод нойр булчирхайн шүүрэлд нөлөөлөх эм | | | | | | | | | |
| 358 | панкреатин | шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай) | + | + | + | + | ЖГ | | |
| 359 | панкреатин + симетикон | шахмал, (нийлмэл найрлагатай) | | + | + | + | ЖГ | | |
| 360 | апротинин | тарилгын уусмал, 10000 ОУН - 100000 ОУН | | + | + | + | Ж | | |
| 17.9 Ходоод гэдэсний замын цус алдалтанд нөлөөлөх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 361 | октреотид | тарилгын уусмал, 0.05мг/мл - 0.1мг/мл | | | + | + | | | |
| 18. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 18.1 Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм | | | | | | | | | |
| 362 | преднизолон | шахмал, 5мг | | + | + | + | Ж | | |
| 363 | дексаметазон | тарилгы уусмал, 4мг/мл (фосфат) | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| 364 | метилпреднизолон | шахмал, 4мг - 16 мг (натрийн сукцинат) | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 6.31мг - 1000мг (натрийн сукцинат) | | | + | + | Ж | | |
| 18.2 Инсулин ба чихрийн шижин эмчлэх бусад бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 365 | гликлазид | шахмал, 30мг - 80мг | | | + | + | + | Ж | |
| 366 | глимепирид | шахмал, 1мг - 3мг | | | + | + | + | Ж | |
| 367 | метформин | шахмал, 500мг - 1000мг (гидрохлорид) | | | + | + | + | Ж | |
| 368 | метформин XR | шахмал, 500мг - 1000мг (гидрохлорид) | | | + | + | + | Ж | |
| 369 | инсулин | тарилгын уусмал, 40 ОУН/мл - 100 ОУН/мл (хэт богино, богино, дундаж, урт хугацааны үйлчлэлтэй холимог 2 шатлалт хүний болон аналог инсулин) | | | + | + | + | Ж | |
| 370 | репаглинид | шахмал, 0.5мг - 2мг | | | | | + | Ж | |
| 371 | вилдаглиптин | шахмал, 50мг | | | | | + | Ж | |
| 372 | лираглутид | тарилгын уусмал, 6мл/мл | | | | | + | Ж | |
| 373 | глюкагон | тарилгын уусмал, 1мг/мл | | | | | + | Ж | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|----|---|--|
| 374 | вилдаглиптин + метформин | шахмал, 50мг + 850мг, 50мг + 1000мг | | | | + | Ж | | |
| 375 | дапаглифлозин | шахмал, 10 мг | | | | + | | | |
| 376 | ранибизумаб | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | | | + | | | |
| 18.3 Бамбай булчирхайн даавар ба түүний эсрэг эм | | | | | | | | | |
| 377 | иодын бэлдмэл | шахмал, капсул, 60мг - 200мг (калийн давс) | | + | + | + | ЖГ | | |
| 378 | левотироксин | шахмал, 25мкг - 150мкг (натрийн давс) | | + | + | + | Ж | | |
| 379 | пропилтиоурацил | шахмал, 50мг | | | + | + | Ж | | |
| 380 | соматотропин | тарилгын уусмал, 10ОУН, 10мл-1.5мл | | | + | + | Ж | | |
| 381 | тиамазол | шахмал 5 мг, 10мг | | | | + | | | |
| 19. Дархлалын системд нөлөөлөх эм | | | | | | | | | |
| 19.1 Оношлогооны бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 382 | туберкулин, цэвэршүүлсэн протейны уусал | тарилгын уусмал | | | | + | + | | |
| 19.2 Ийлдэс ба иммуноглобулины бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 384 | татрангийн эсрэг ийлдэс | тарилгын уусмал, 500 ОУН | | | | + | + | | |
| 385 | хүний иммуноглобулин (хэвийн) | тарилгын уусмал, 50мг/мл | | | | + | + | Ж | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 386 | галзуугийн эсрэг иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 150 ОУН/мл | | | + | + | | | |
| 387 | боомын эсрэг иммуноглобулин | тарилгын уусмал | | | + | + | | | |
| 388 | татрангийн эсрэг иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 500ОУН | | | + | + | | | |
| 389 | хиамдалын ийлдэс (А,В,Е төрөл) | тарилгын уусмал, 5000 ОУН - 10000 ОУН | | | | + | | | |
| 390 | сахуугийн ийлдэс | тарилгын уусмал, 10000 ОУН - 20000 ОУН | | | | + | | | |
| 391 | гепатит Б - ийн иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 100 ОУН - 200 ОУН | | | | + | | | |
| 392 | хачигт энцефалитын иммуноглобулин | тарилгын уусмал, 1 мл | | | | + | | | |
| 19.3 Вакцин | | | | | | | | | |
| 19.3.1 Нийтлэг дархлаажуулалтанд хэрэглэх | | | | | | | | | |
| 393 | сүрьеэгийн (БЦЖ) | тарилга (уусмал, тарилга) | | | + | + | + | | |
| 394 | гепатит А | тарилга (уусмал, тарилга) | | | + | + | + | | |
| 395 | гепатит Б - ийн | тарилга (уусмал, | | | + | + | + | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|--|---|---|---|--|--|--|
| | | тарилга) | | | | | | | |
| 396 | улаан бурхан | тарилга (уусмал, тарилга) | | + | + | + | | | |
| 397 | улаан бурхан - гахайн хавдар - улаануудын | тарилга (уусмал, тарилга) | | + | + | + | | | |
| 398 | сахуу - хөхүүл ханиад - татран - В гепатит - хемофилюс инфлюенза В-ийн | тарилга (уусмал, тарилга) | | + | + | + | | | |
| 399 | сахуу - татрангийн | тарилга (уусмал, тарилга) | | + | + | + | | | |
| 400 | татрангийн вакцин | 1мл тарилгын уусмал | | | | | | | |
| 401 | халдварт саагийн | тарилга (уусмал, тарилга) | | + | + | + | | | |
| 402 | томуугийн | тарилга (уусмал, тарилга) | | + | + | + | | | |
| 403 | боомын вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | | | | + | | | |
| 404 | пневмококкын эсрэг вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | | | | + | | | |
| 405 | хачигт энцефалитын эсрэг хатааж хөлдөөсөн вакцин | тун-0.5мл, 2 тун-1мл | | | | + | | | |

| 19.3.2 Сонгомол бүлгийн бэлдмэл | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|
| 406 | балнадын | тарилга (уусмал, тарилга) | | | + | + | |
| 407 | галзуугийн | тарилга (уусмал, тарилга) | | | + | + | |
| 408 | менингококкийн | тарилга (уусмал, тарилга) | | | + | + | |
| 409 | тарваган тахлын | тарилга (уусмал, тарилга) | | | + | + | |
| 410 | шар чичрэгийн вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | | | | + | |
| 411 | хүний хөхөнцөр вирүсийн эсрэг вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | | | | + | |
| 19.3.3 Бусад | | | | | | | |
| 412 | стафилококкын анатоксин | тарилга (уусмал, тарилга) | | | | + | |
| 413 | сальмонеллэзын нян залгиур | уух уусмал | | | | + | |
| 414 | балнадын нян залгиур | уух уусмал | | | | + | |
| 415 | цусан суулгын нян залгиур | уух уусмал | | | | + | |
| 19.3.4 Ашигтай микрофлорууд ба эс залгиурууд | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|----|---|--|
| 416 | сахаромицес буларди | капсул, хөвмөл бэлтгэх нунтаг 250мг | | | + | + | ЖГ | | |
| 417 | ашигтай микрофлорууд | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) | | | + | + | ЖГ | | |
| 418 | эс залгиурууд | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) | | | + | + | ЖГ | | |
| 419 | ашигтай микрофлорууд + эс залгиурууд | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) | | | + | + | ЖГ | | |
| 19.3.5 Дархлал дэмжих бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 420 | тимомодулин | шахмал, 80мг | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын нунтаг, 100мг | | | + | + | + | Ж | |
| 421 | рекомбинант интерлейкин - 2 | тарилгын уусмал, 0.25мг - 1мг | | | | + | Ж | | |
| 422 | циклоферон /мегломина акридоацетат/ | тарилга 12.5%-2мл, шахмал 250мг | | | | + | Ж | | |
| 20. Булчин сулруулах ба холинэстеразийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
| 423 | атракриум | тарилгын уусмал, 10мг/мл (бесилат) | | | + | + | | | |
| 424 | неостигмин | шахмал, 15мг (бромид) | | | + | + | | | |
| | | тарилгын уусмал, 0.5мг/мл (метилсульфат) | | | + | + | | | |
| 425 | суксаметон | тарилгын уусмал, 50 мг/мл (хлорид) | | | + | + | | | |
| 426 | баклофен | шахмал, 10 мг, 20 мг | | | + | + | | | |
| 427 | рокурониум | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | | + | + | | | |
| 428 | толперизон | шахмал, 50мг - 150мг | | | + | + | | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 100мг/мл | | | + | + | | | |
| 429 | пиридостигмин бромид | шахмал 60мг, ретарт 180мг | | | + | + | | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг- 1мл | | | + | + | | | |
| 21. Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 21.1 Халдварын эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 430 | натрийн сульфатамид | нүдний дусал, 20% - 30% | + | + | + | + | | Ж | |
| 431 | ацикловир | нүдний тосон түрхлэг, 3% | | | + | + | + | Ж | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 432 | тетрациклин | нүдний тосон түрхлэг, 1% (гидрохлорид) | | + | + | + | Ж | | |
| 433 | гентамицин | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) (сульфат) | | + | + | + | Ж | | |
| 434 | хлорамфеникол | нүдний дусал, 0.25% - 1% (2.5мг/мл - 10мг/мл) | | + | + | + | Ж | | |
| 435 | ципрофлоксацин | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) | | + | + | + | Ж | | |
| 436 | офлоксацин | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) | | | + | + | Ж | | |
| 437 | моксифлоксацин | нүдний дусал, 0.5% (5мг/мл) | | | + | + | Ж | | |
| 438 | тобрамицин | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) | | | + | + | Ж | | |
| 21.2 Үрэвслийн эсрэг бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 439 | преднизолон | тарилгын уусмал, 0.1% - 1% (5мг/мл - 10мг/мл) (натрийн фосфат) | | + | + | + | Ж | | |
| 440 | дексаметазон | нүдний дусал, 0.1% (1мг/мл) | | | + | + | Ж | | |
| 441 | дексаметазон + неомицин | уусмал, 4 мл | | | + | + | Ж | | |
| 442 | ранибизумаб | тарилгын уусмал, 10мг/мл | | | | + | Ж | | |
| 443 | триамцинолон | тарилгын уусмал, 40мг/мл, | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|---|---|---|----|--|--|
| | | тосон түрхлэг, 1мг -6г, | | + | + | + | ЖГ | | |
| | | шахмал, 4мг | | + | + | + | Ж | | |
| 444 | бролицизумаб | уусмал 120мг/мл- 0.23мл | | | | + | | | |
| 21.3 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 445 | тетракаин | нүдний дусаалга, 0.5% (5мг/мл) (гидрохлорид) | | | + | + | | | |
| 21.4 Нүдний чинэрээ эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 446 | пилокарпин | нүдний дусал, 10мг/мл, (гидрохлорид, нитрат) | | + | + | + | Ж | | |
| 447 | тимолол | нүдний дусал, 0.25% - 0.5% (2.5мг/мл - 5мг/мл) (гидрогений малеат) | | + | + | + | Ж | | |
| 448 | ацетозоламид | шахмал, 250мг | | | + | + | Ж | | |
| 449 | латанопрост | нүдний дусал, 0.005% | | | + | + | Ж | | |
| 450 | дорзоламид | нүдний дусал, 2% (20мг/мл) (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 451 | травопрост | нүдний дусал, 0.004% (гидрохлорид) | | | | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|
| 452 | бринзоламид+ броминидин | нүдний дусал, 10мг/мл+5мг/мл | | | | + | Ж | | |
| 453 | бринзоламид+тимолол | нүдний дусал, 10мг/мл+5мг/мл | | | | + | Ж | | |
| 21.5 Хүүхэн хараа өргөсгөх | | | | | | | | | |
| 454 | атропин | нүдний дусал, 0.1% - 1% (сульфат) | | | | + | + | | |
| 455 | эпинефрин (адреналин) | нүдний дусал, 2% (гидрохлорид) | | | | + | + | | |
| 456 | фенилэфрин гидрохлорид | уусмал, 0.25%-15мл, 0.125%-15мл | | | | + | + | | |
| 22. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд болон перинатал үеийн тусламж үйлчилгээнд хэрэглэх бэлдмэлүүд | | | | | | | | | |
| 22.1 Эр бэлгийн даавар ба түүнд нөлөөлөх эмүүд | | | | | | | | | |
| 457 | метилтестостерон | шахмал, 5мг; 10мг | | | | + | + | Ж | |
| 458 | тестостерон | тарилгын уусмал, 200мг - 250мг (энантат) | | | | | + | Ж | |
| 22.2 Түрүү булчирхайн эмгэгт хэрэглэх эм | | | | | | | | | |
| 459 | тамсулозин | шахмал, капсул, 0.4мг (гидрохлорид) | | | | + | + | Ж | |
| 460 | финастерид | шахмал, капсул, 5мг | | | | + | + | Ж | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| 461 | дутастерид | капсул, 0.5мг | | | + | + | Ж | | |
| 22.3 Жирэмслэлтээс хамгаалах эм бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 22.3.1 Дааврын бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 462 | этинилэтрадиол + левоноргестрел | шахмал, 0.02мг - 0.04мг + 0.15мг | | | + | + | + | Ж | |
| 463 | этинилэтрадиол + дроспиренон | шахмал, 20мкг - 30мкг + 3мг | | | + | + | + | Ж | |
| 464 | этинилэтрадиол + ципротероны ацетат | шахмал, 20мкг - 30мкг + 2мг | | | + | + | + | Ж | |
| 465 | эстрадиол валериат + левоноргестрел | шахмал, 2мг + 15мкг | | | | + | + | Ж | |
| 466 | медроксипрогестерон | депо-тарилгын уусмал, 50мг/мл - 150мг/мл (ацетат) | | | | + | + | | |
| 467 | левоноргестрел чөлөөлөгч суулгац | суулгац, 75мг нийлбэр левоноргестрел 150мг (2 салаатай) | | | | | + | Ж | |
| 468 | дезогестерол + этинилэстрадиол | шахмал, 150мкг + 20мкг, 150мкг + 30мкг | | | | + | + | Ж | |
| 22.4 Өндгөвчний даавар | | | | | | | | | |
| 469 | этинилэстрадиол | шахмал, 50мкг | | | | + | + | Ж | |
| 22.5 Үр тогтолтыг дэмжих бэлдмэл | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|
| 470 | кломифен | шахмал, 50мг (цитрат) | | | + | + | | | |
| 471 | цетрореликс | тарилгын нунтаг, 0.25г - 3г | | | | + | | | |
| 472 | фоллитропин альфа | тарилгын нунтаг, 75 ОУН - 300 ОУН | | | | + | | | |
| 473 | хорионы гонадотропин альфа | тарилгын нунтаг, 250мкг, 1500 ОУН - 3000 ОУН | | | | + | | | |
| 22.6 Шар биеийн даавар | | | | | | | | | |
| 474 | медроксипрогестерон | депо-тарилгын уусмал, 50мг/мл - 150мг/мл (ацетат) | | | + | + | | | |
| 475 | улипристал | шахмал, 5мг | | | | + | | | |
| 22.7 Окситоцин болон умай агшаах бэлдмэлүүд | | | | | | | | | |
| 476 | окситоцин | тарилгын уусмал, 5 ОУН/мл - 10 ОУН/мл | | | + | + | | | |
| 477 | метилэргометрин | тарилгын уусмал, 200мкг (гидрогений малеат) | | | + | + | | | |
| 478 | мизопростол*** | шахмал, 200мкг | | | + | + | | | |
| 479 | мифепристон*** | шахмал, 25мг | | | + | + | | | |
| 22.8 Окситоцины эсрэг умайн булчин сулруулах бэлдмэлүүд | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 480 | сальбутамол | шахмал, капсул, 2мг - 8мг (сульфат) | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 50мкг/мл (сульфат) | | | + | + | | | |
| 481 | гексопреналин | тарилгын уусмал, 100мкг | | | + | + | | | |
| 482 | дидрогестерон | шахмал, капсул, 10мг | | | | + | Ж | | |
| 23. Диализд хэрэглэх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 483 | диализийн уусмал | хэвлийд сэлбэх уусмал | | | | + | | | |
| 484 | севеламер | шахмал, 800мг | | | | + | Ж | | |
| 24. Сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 24.1 Солиорлыг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 485 | хлорпромазин | шахмал, капсул, 10мг - 100мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 486 | левомепромазин | шахмал, капсул, 25мг | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 25мг/мл | | | + | + | Ж | | |
| 487 | галоперидол | шахмал, 1.5мг - 5мг | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | 5мг/мл | | | | | | | |
| 488 | дроперидол | тарилгын уусмал, 2.5мг/мл | | | + | + | | Ж | |
| 489 | рисперидон | шахмал, 0.5мг - 4мг | | | + | + | | Ж | |
| 490 | флуфеназин | тарилгын уусмал, 25мг/мл (деконат, энантат) | | | + | + | | Ж | |
| 491 | зуклопентиксол | шахмал, капсул, 25мг/мл (деконат, энантат) | | | | + | | | |
| | | тарилгын уусмал, 2мг - 100мг | | | | + | | | |
| 492 | клозапин | шахмал, капсул, 25мг - 200мг | | | | + | | | |
| 493 | перфеназин | шахмал, 2мг - 4мг | | | | + | | | |
| 494 | кветиапин | шахмал, капсул, 250мг - 300мг | | | | + | | Ж | |
| 495 | оланзапин | уусдаг шахмал, 5-20мг | | | | + | | Ж | |
| 24.2 Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг эмчлэх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 24.2.1 Сэтгэл гутралыг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 496 | амитриптиллин | шахмал, 10мг - 75мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | | Ж | |
| 497 | сертралин | шахмал, капсул, 50мг - 100мг | | | + | + | | Ж | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 498 | флуоксетин | шахмал, капсул, 20мг (гидрохлорид) | | | | | + | Ж | | |
| 499 | циталопрам | шахмал, 10мг - 40мг | | | | | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 20мг/мл | | | | | + | Ж | | |
| 500 | миртазапин | шахмал, 15-30мг | | | | | + | Ж | | |
| 501 | пароксетин | шахмал, 20мг | | | | | + | | | |
| 24.2.2 Сэтгэл хөдлөлийн хоёр туйлт эмгэгийг эмчлэх бэлдмэл | | | | | | | | | | |
| 502 | карбамазепин | шахмал, капсул, 100мг - 400мг | + | + | + | | + | Ж | | |
| 503 | литийн карбонат | шахмал, капсул, 100мг - 300мг | + | + | + | | + | Ж | | |
| 504 | вальпроны хүчил (натрийн вальпроат) | шахмал, капсул, 100мг - 500мг | | | + | + | + | Ж | | |
| | | мөхлөг, 100мг | | | + | + | + | Ж | | |
| | | сироп, 54.64мг/мл | | | + | + | + | Ж | | |
| 24.2.3 Тархины цусан хангамж сайжруулах эм | | | | | | | | | | |
| 505 | циннаризин | шахмал, 25мг | + | + | + | | + | Ж | | |
| 506 | пентоксифиллин | шахмал, капсул, 100мг - 400мг | | | | | + | + | Ж | |
| | | тарилгын уусмал, 20мг/мл | | | | | + | + | | |
| 507 | винпоцетин | шахмал, 5мг - 10мг | | | | | + | + | Ж | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл | | | + | + | Ж | | |
| 508 | инозин+никотинамид+рибофлавин+сукцинат (цитофлавин) | тарилгын уусмал, 0.2г+0.1г+0.02г+1г- 10мл | | | + | + | Ж | | |
| | | шахмал, 0.3г+0.05г+0.025г+0.00 5г | | | + | + | Ж | | |
| 509 | нимодипин | шахмал, 30 мг | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал,0,2мг/мл-50мл, 10мг-50мл | | | + | + | | | |
| 510 | церебролизин | тарилгын уусмал, 1- 10мл | | | + | + | Ж | | |
| 24.2.4 Тархины эд, эсийг хамгаалах эм | | | | | | | | | |
| 511 | пирацетам | шахмал, капсул, 200мг - 800мг | + | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 10% - 20% | | + | + | + | Ж | | |
| 512 | цитиколин | шахмал, капсул, 500мг | | | | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 250мг - 1000мг | | | | + | Ж | | |
| 513 | метилкобаламин | 500 мкг шахмал | | | | + | Ж | | |
| 514 | инозин+никотинамид+рибофлавин+сукцинат (Цитофлавин) | тарилгын уусмал, 0.2г+0.1г+0.02г+1г- 10мл | | | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|----|--|--|
| | | шахмал, 0.3г+0.05г+0.025г+0.005г | | | + | + | Ж | | |
| 24.2.5 Мэдрэлийн эмгэгшилд хэрэглэх эм | | | | | | | | | |
| 515 | ипидакриний гидрохлорид | шахмал, 20мг | | | | + | | | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл - 15мг/мл | | | | + | | | |
| 516 | гастродин | тарилгын уусмал, 200мг | | | | + | Ж | | |
| 517 | галантамин | шахмал, 8 мг-16мг | | | + | + | Ж | | |
| 518 | метилкобаламин | шахмал, 500мкг | | | | + | Ж | | |
| 24.3 Сэтгэл түгшилтийг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 519 | диазепам | шахмал, 2мг -10 мг | + | + | + | + | СЖ | | |
| | | тарилгын уусмал, 5мг/мл | | + | + | + | СЖ | | |
| 520 | альпразолам | шахмал, 250мкг - 2мг | | | | + | | | |
| 521 | мербикар | шахмал, 300мг - 500мг | | | | + | | | |
| 24.4 Үл ялиг зовлонт байдлыг эмчлэх эм | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|
| 522 | комипрамин | шахмал, капсул, 10мг - 75мг (гидрохлорид) | | | | + | | | |
| 24.5 Сэтгэц идэвхт эмийн бодисын шалтгаант эмгэгийг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 523 | налтрексон | шахмал, 50мг (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| | | суулгац (гидрохлорид) | | | + | + | Ж | | |
| 25. Амьсгалын эрхтэний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 25.1 Гуурсан хоолойн багтраа эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 524 | аминофиллин | шахмал, 150мг - 350мг | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 24мг/мл | | + | + | + | Ж | | |
| 525 | сальбутамол | шахмал, капсул, 4мг - 8мг (сульфат) | | + | + | + | Ж | | |
| | | ингаляцийн цацлага, 100мкг (сульфат) | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал, 50мкг/мл (сульфат) | | | | + | + | Ж | |
| 526 | сальбутамол+ ипратропийн бромид | утлагад зориулсан хөвмөл, 2.5-3мг/2.5мл+500мкг/2.5мл | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 527 | беклометазон | ингаляцийн цацлага, 50мкг - 100мкг (дипропионат) | | + | + | + | Ж | | |
| 528 | беклометазон + формотерол | ингаляци цацлага 100мкг/тун+6мкг/тун | | + | + | + | Ж | | |
| 529 | будесонид | ингаляцийн цацлага, 100мкг - 400мкг | | + | + | + | Ж | | |
| 530 | ипратропийн бромид | ингаляцийн цацлага, 20мкг - 500мкг | | + | + | + | Ж | | |
| 531 | сальметерол | ингаляцийн цацлага, 25мкг - 50мкг | | | + | + | Ж | | |
| 532 | флутиказон | ингаляцийн цацлага, 25мкг - 500мкг (порпионат) | | | + | + | Ж | | |
| 533 | монтелукаст | шахмал, 4мг - 10мг | | | + | + | Ж | | |
| 534 | тербуталин сульфат | шахмал 2.5мг, | | | + | + | Ж | | |
| | | сироп 1.5мг/5мл-60мл, | | | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын уусмал 0.5мг/1мл | | | + | + | Ж | | |
| 535 | гликопирроний бромид | капсул, 50мкг | | | | + | | | |
| 536 | флутиказон + сальметерол | ингаляцийн нунтаг, 250мкг + 50мкг, 500мкг + 50мкг | | | | + | | | |
| 537 | фенотерол + ипратропийн бромид | ингаляцийн цацлага, 1.25мг + 500мкг | | | | + | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|----|--|--|
| 538 | формотерол фумарат | цацлага 12мкг | | | | + | | | |
| 539 | теофиллин эфедрин | шахмал, 200-350мг | | | | + | Ж | | |
| 25.2 Ханиалга намдаах эм | | | | | | | | | |
| 540 | преноксдиазин | шахмал, 100мг | + | + | + | + | Ж | | |
| 541 | кодейн | шахмал, 15мг - 30мг | | | + | + | МЖ | | |
| 25.3 Цэр ховлох эм | | | | | | | | | |
| 542 | амброксол | шахмал, 30мг - 60мг (гидрохлорид) | | + | + | + | ЖГ | | |
| 543 | ацетилцистеин | шахмал, 100мг - 600мг | | + | + | + | ЖГ | | |
| | | нунтаг, 100мг - 600мг | | + | + | + | ЖГ | | |
| 544 | фенспирид | шахмал, 80мг | | | | + | | | |
| 26. Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 26.1 Уулгаж сэлбэх | | | | | | | | | |
| 545 | олон найрлагат давсны бэлдмэл | нунтаг, (глюкоз + натрийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/ натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л | + | + | + | + | ЖГ | | |

| 26.2 Судсанд дуслaar сэлбэх | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---|----|--|--|
| 546 | глюкоз (декстроз) | тарилгын уусмал, 40% | | + | + | + | Ж | | |
| | | тарилгын шингэн, 5% - 20% | | + | + | + | Ж | | |
| 547 | глюкоз (декстроз) + натрийн хлоридын холимог уусмал | тарилгын шингэн, 5% + 0.9% | | + | + | + | Ж | | |
| 548 | калийн хлорид | тарилгын шингэн, 7.5% | | + | + | + | | | |
| 549 | натрийн хлорид | тарилгын шингэн, 0.9% | | + | + | + | Ж | | |
| 550 | натрийн бикарбонат | тарилгын шингэн, 4% | | + | + | + | Ж | | |
| 551 | рингерийн уусмал | тарилгын шингэн, 100мл - 1000мл | | + | + | + | Ж | | |
| 552 | рингер лактатийн уусмал | тарилгын шингэн, 100мл - 1000мл | | + | + | + | Ж | | |
| 27. Амин дэм, эрдэс бодисууд | | | | | | | | | |
| 553 | аскорбины хүчил | шахмал, 50мг | + | + | + | + | ЖГ | | |
| | | тарилгын уусмал, 50мг/мл | | + | + | + | Ж | | |
| 554 | кальцийн глюконат | шахмал, 500мг | + | + | + | + | ЖГ | | |
| | | тарилгын уусмал, 100мг/мл | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|---|---|----|--|--|
| 555 | ретинол | шахмал, капсул, 10000 ОУН - 200000 ОУН (пальмитат) | | + | + | + | ЖГ | | |
| | | дуслаар ууж хэрэглэх тосон уусмал, 100000 ОУН/мл (пальмитат) | | + | + | + | ЖГ | | |
| 556 | эргокальциферол | шахмал, капсул, 50000 ОУН | | + | + | + | Ж | | |
| | | уух усан уусмал, 200 ОУН/мл - 10000 ОУН/мл | | + | + | + | Ж | | |
| 557 | холекальциферол | шахмал, капсул 400 ОУН - 1000 ОУН | | + | + | + | ЖГ | | |
| | | уух усан уусмал, 400 ОУН/мл | | + | + | + | ЖГ | | |
| 558 | кальцетриол | 0.25мкг зөөлөн капсул | | | + | + | Ж | | |
| 28. Чих, хамар, хоолойн өвчинд хэрэглэх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 559 | мометазон фураат моногидрат | хамрын цацлага 0.5мг/мл-18мл | | | | + | ЖГ | | |
| 560 | фенилэфрин гидрохлорид | 0.25%-15мл% 0.125%-15мл | | | + | + | | | |
| 561 | ципрофлоксацин + гидрокортизон | чихний дусаалга, 0.2% | | | + | + | Ж | | |
| 562 | ципрофлоксацин | чихний дусаалга, 7 мл | | + | + | + | Ж | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|----|--|--|
| 563 | феназон, лидокаин гидрохлорид | чихний дусаалга, 0.64г+0.16г-15 мл | | | + | + | ЖГ | | |
| 29. Үе мөчний эмгэг нөлөөлөх бэлдмэл | | | | | | | | | |
| 29.1 Тулай өвчнийг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 564 | аллопуринол | шахмал, капсул, 100мг - 300мг | | | + | + | Ж | | |
| 565 | колхицин | шахмал, 0.5-0.6мг | | | + | + | Ж | | |
| 566 | фебуксостат | шахмал, 40-120мг | | | | + | Ж | | |
| 29.2 Үе мөчний өвчнийг эмчлэх эм | | | | | | | | | |
| 567 | хлорохин | шахмал, капсул, 100мг - 200мг (фосфат, сульфат) | | | + | + | Ж | | |
| 568 | азатиоприн | шахмал, капсул, 50мг | | | + | + | Ж | | |
| 569 | метотрексат | шахмал, 2.5мг - 10мг (натрийн давс) | | | + | + | Ж | | |
| 570 | сульфасалазин | шахмал, капсул, 500мг | | | + | + | Ж | | |
| | | мөхлөг, нунтаг | | | + | + | Ж | | |
| 571 | целекоксиб | шахмал, капсул, 100мг, 200мг | | | + | + | Ж | | |

Анхааруулга, нас болон тунгийн хязгаартай хэрэглэх эмүүд

| | |
|---|--|
| ацетилсалицилийн хүчил | 12 наснаас дээш |
| атропин | 3 сараас дээш |
| бензил бензоат | 2 наснаас дээш |
| бетаметазон (арьсанд зориулсан бэлдмэл) | Нярайд хэрэглэхгүй (гидрокортизоноор орлуулах). |
| дилоксанид | 25 кг-аас дээш жинтэйд |
| ибупрофен | 3 сараас дээш (Тарилгын уусмал хэлбэрт хамаарахгүй. Тарилгын уусмалыг нярайн цусан хангамжийн дутагдалд эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ) |
| ксилометазолин | 3 сараас дээш |
| лоперамид | 4 наснаас дээш |
| метоклопрамид | Нярайд хэрэглэхгүй. |
| мизопростол | Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ. |
| мифепристон | Зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд, эмчийн хяналтанд хэрэглэнэ. |
| ондансетрон | 1 сараас дээш |
| парацетамол | Үрэвслийн эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхгүй. |
| пропофол | 1 сараас дээш |
| ретинол | Жирэмсэн үед хоногт 25000 ОУН тунгаас ихгүй хэрэглэнэ. |
| этилийн спирт агуулсан бэлдмэл | 2 наснаас дээш |

| | |
|-----------------------------------|---|
| сульфаметоксазол + триметоприм | 6 сараас дээш |
| тетракаин | Нярайд хэрэглэхгүй. |
| цефазолин | 1 сараас дээш |
| цефтриаксон | жирэмсний 41 долоо хоног дээш |
| ципрофлоксацин | 12 наснаас дээш |
| флооксетин | 8 наснаас дээш |
| эфавиренз | 3 наснаас дээш эсвэл 10кг-аас дээш жинтэй |
| дарунавир | 3 наснаас дээш |
| мөнгөний сульфадиазин | 2 сараас дээш |

Тайлбар, тэмдэглэгээ

| | |
|----------------|--|
| ЖГ | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жоргүй олгоно. |
| Ж | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн санд жороор олгоно. |
| Ж* | Зөвхөн амбулаторийн үйлчлүүлэгчидэд үйлчлэх эмийн санд жороор олгоно. |
| СЖ | Жороор олгоно (сэтгэцэд нөлөөт эм). |
| МЖ | Мансууруулах эмийн жороор олгоно. |
| шахмал, капсул | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (бүрхүүлтэй, хатуу, зөөлөн, уртасгасан үйлчилгээтэй гэх мэт). |

| | |
|-----------------|---|
| сироп | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (уусмал, хөвмөл, шингэн гэх мэт). |
| тарилгын уусмал | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (коцентрацтай, тосон, хөвмөл гэх мэт). |
| тарилгын нунтаг | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (лиофилизат, тарилгын нунтаг уусгагчийн хамт гэх мэт). |
| лаа | Бүх хэлбэрүүд хамаарна (үтрээний, шулуун гэдэсний гэх мэт). |

Тухайн шатлалд заавал байх шаардлагагүй эмийг хоосон нүдээр тэмдэглэв.

--- o O o ---